

**Doubledex™ ½ Vet**  
Triclabendazole BP & Levamisole Hydrochloride BP Bolus

**Composition**  
Each bolus contains  
Triclabendazole BP 900 mg &  
Levamisole Hydrochloride BP  
equivalent to Levamisole 600 mg

**Mode of action**  
Doubledex™ ½ Vet bolus contains two ideal anthelmintics like Triclabendazole & Levamisole. Triclabendazole acts against mature and immature flukes specially against liver flukes (Fasciolosis). It binds to the beta tubulin of the parasites and blocks polymerization of tubulin into microtubules. The process damages the integrity and transport functions of cells within the parasite and ultimately the parasite dies. Levamisole is an ideal broad spectrum anthelmintic that acts against respiratory and intestinal round worms. It causes lysis of worms by neuromuscular paralysis. Moreover, it acts as an immunomodulator.

**Indication**  
Doubledex™ ½ Vet bolus is a broad spectrum anthelmintic, effective against trematode & nematode worms of cattle, buffalo, sheep/goat etc. Doubledex™ ½ Vet bolus is used for the treatment of acute, sub acute and chronic Fascioliasis (infestation of trematodes) caused by *Fasciola gigantica* & *F. hepatica*. Doubledex™ ½ Vet bolus is also used against major stomach, intestine and respiratory nematodes of ruminants, such as  
• *Haemonchus spp.* • *Ostertagia spp.* • *Cooperia spp.*  
• *Trichostrongylus spp.* • *Bunostomum spp.* • *Esophagostomum spp.*  
• *Trichuris spp.* • *Dictyocaulus spp.*

**Dosage & Administration**  
1 Doubledex™ ½ Vet bolus per 41-75 kg body weight or 19.5 mg per kg body weight or as per following schedule:

Body weight (Kg)	No. of bolus
21-40	1/2 Bolus
41-75	1 Bolus
76-150	2 Bolus
151-225	3 Bolus
226-300	4 Bolus
301-375	5 Bolus

Doubledex™ ½ Vet bolus can be administered orally through water or by mixing with any feed (e.g. with molasses or by wrapping in a banana leaf) and feeding to the animal.  
Or, as per direction of registered veterinarian / consultant.

**Contraindication**  
Doubledex™ ½ Vet bolus is contraindicated in animals hypersensitive to active ingredients.

**Side effect**  
Doubledex™ ½ Vet bolus is well tolerated in livestock. At the recommended doses there is no side effect.

**Drug interactions**  
This combination should not be used with Pyrantel, Morantel and Diethylcarbamazine.

**Over dosage**  
Triclabendazole 16 times and Levamisole 3 times more safe than the recommended dosages.

**Withdrawal period**  
Milk: 10 days; Meat: 28 days

**Uses in pregnancy and lactation**  
There is no effect on pregnant animals if given in recommended dosage. Doubledex™ ½ Vet bolus has no embryonic or teratogenic effect reported in fetus.

**Precaution**  
The animal should be given adequate fluid during and after therapy.

**Storage Condition**  
Store at or below 25 °C temperature. Keep away from light and wet place. Keep out of reach of children.

**Packaging**  
Doubledex™ ½ Vet Bolus: Box containing 5 strips of 4 boli each. Each bolus contains Triclabendazole BP 900 mg and Levamisole Hydrochloride BP equivalent to Levamisole 600 mg.

Manufactured by:  
**SK+F**  
**ESKAYEF PHARMACEUTICALS LTD.**  
ANIMAL HEALTH DIVISION  
RUPGANJ, NARAYANGANJ, BANGLADESH  
TM TRADEMARK  
R/P/M/1674 V01

**ডাবলডেক্স™ ½ ভেট**  
ট্রাইক্লাবেনডাজল বি.পি. এবং লেভামিসল হাইড্রোক্লোরাইড বি.পি. বোলাস

**উপাদান**  
প্রতি বোলাসে আছে  
ট্রাইক্লাবেনডাজল বি.পি. ৯০০ মি.গ্রা. ও  
লেভামিসল ৬০০ মি.গ্রা. এবং সমতুল্য  
লেভামিসল হাইড্রোক্লোরাইড বি.পি.

**কার্যপথগুলী**  
ডাবলডেক্স™ ½ ভেট এ আছে আদর্শ কৃমিনাশক যেমন- ট্রাইক্লাবেনডাজল এবং  
লেভামিসল প্রতি বোলাসে প্রাণ্ত বয়ক ও অসাংত বয়ক কলিজা কৃমির (ফেসিওলিয়াসিস)  
বিরুদ্ধে কারে। এটি কৃমির বিটা চিউলিংস তেরীর ক্ষমতা প্রতিরোধ করে। ফলে কৃমির কোরের  
সম্পূর্ণ ও পরিষ্কার শক্তি বাসে প্রাণ্ত হয় এবং অবশেষে কৃমি মারা যায়।  
লেভামিসল একটি ব্রডস্পেক্ট্রাম কৃমিনাশক যা অক্সিনালী ও শ্বাসনালীর গোলকৃমি দূর করে।  
এটি কৃমির নিউরোমাসকুলার প্যারালাইসিসের মাধ্যমে একে ধ্বংস করে। উপরন্ত লেভামিসল  
একটি ইমিউনোমড্যুলেটর হিসেবেও কাজ করে।

**নির্দেশনা**  
ডাবলডেক্স™ ½ ভেট বোলাস একটি ব্রডস্পেক্ট্রাম কৃমিনাশক। যা গরু, মহিষ, তেক্কা/ছাগল  
ইত্যাদি প্রাণীর গোলকৃমি ও পাতাকুমির বিরুদ্ধে কার্যকর। ডাবলডেক্স™ ½ ভেট বোলাস  
*Fasciola hepatica* & *Fasciola gigantica* দ্বারা সৃষ্টি তৈরি, অতি তীব্র ও দীর্ঘ মেয়াদি কলিজা  
কৃমির সংক্রমণের চিকিৎসার ব্যবহার করা হয়। এছাড়াও ডাবলডেক্স™ ½ ভেট বোলাস  
পাকছুলী, অক্সিনালী ও শ্বাসনালীর প্রধান গোলকৃমির বিরুদ্ধে কার্যকর।

যেমন-  
• *Haemonchus spp.* • *Ostertagia spp.* • *Cooperia spp.*  
• *Trichostrongylus spp.* • *Bunostomum spp.* • *Esophagostomum spp.*  
• *Trichuris spp.* • *Dictyocaulus spp.*

মাত্রা ও প্রয়োগবিধি  
১ টি ডাবলডেক্স™ ½ ভেট বোলাস প্রতি ৪১-৭৫ কেজি দৈহিক ওজনের জন্য অথবা ১৯.৫  
মি.গ্রা. প্রতি কেজি দৈহিক ওজনের অথবা নিচের ছক অনুযায়ী গুরুত্ব খাওয়াতে হবেঃ

দৈহিক ওজন (কেজি)	বোলাস সংখ্যা
২১-৪০	১/২ টি বোলাস
৪১-৭৫	১ টি বোলাস
৭৬-১৫০	২ টি বোলাস
১৫১-২২৫	৩ টি বোলাস
২২৬-৩০০	৪ টি বোলাস
৩০১-৩৭৫	৫ টি বোলাস

ডাবলডেক্স™ ½ ভেট বোলাস পানিতে গুলিয়ে অথবা অন্য কোন খাদ্যের সাথে মিশিয়ে  
(যেমন- চিটাঙ্গুল বা রাবের সাথে মিশিয়ে বা কলা পাতায় শুড়িয়ে) সরাসরি খাওয়াতে হবে।  
অথবা, মোজস্টার্ট ভেটেরিনারিয়াল/কমসালটেট এবং পরামুর্শ অনুযায়ী ব্যবহার্য।

**প্রতিনির্দেশনা**  
সক্রিয় উপাদানসমূহের প্রতি অতি সংবেদনশীল প্রানিতে ব্যবহার করা যাবে না।

**পর্যবেক্ষণ**  
ডাবলডেক্স™ ½ ভেট বোলাস গবাদি প্রানিতে অত্যন্ত সহনীয়। অন্যমৌদ্রিত মাত্রায় ব্যবহারে  
কোন পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া নাই।

**অন্যান্য গুরুত্ব সহনের সাথে ক্রিয়া**  
এই স্বার্থমুন্তের সাথে পাইরান্টেল, মরান্টেল ও ডাইইলকার্মাজিন ব্যবহার করা যাবে  
না।

**মাত্রাধিক**  
অন্যমৌদ্রিত মাত্রার চেয়ে ট্রাইক্লাবেনডাজল ১৬ গুণ এবং লেভামিসল ৩ গুণ নিরাপদ।

**প্রত্যাহারকাল**  
মাসে ৪-৮ দিন, দুর্ধ ৪-১০ দিন

**গর্ভবতীয়া ও দুর্ঘানকালীন সময়ে ব্যবহার**  
অন্যমৌদ্রিত মাত্রায় গর্ভবতীয়া কোন ক্ষতিকর প্রভাবের তথ্য নেই। কোন ধরনের ক্রণ  
বিক্রিয়া বা টেরাটোজেনিক প্রভাবের ও তথ্য নেই।

**সতর্কতা**  
চিকিৎসা চলাকালীন সময়ে ও পরে পশকে পর্যাপ্ত পানি খাওয়াতে হবে।

**স্বরক্ষণ**  
২৫ °C সে তাপমাত্রায় অথবা এর নিচে রাখুন। আলো ও অক্রিতা থেকে দূরে রাখুন। সকল গুরুত্ব  
শিশুদের নাগাদের বাইরে রাখুন।

**সরবরাহ**  
ডাবলডেক্স™ ½ ভেট বোলাস ৪ প্রতিটি বাল্কে আছে ডাবলডেক্স™ ½ ভেট এর ৫ টি স্ট্রিপ  
যার প্রতিটি স্ট্রিপে আছে ৪ টি করে বোলাস। প্রতি বোলাসে আছে ট্রাইক্লাবেনডাজল বি.পি.  
৯০০ মি.গ্রা. ও লেভামিসল ৬০০ মি.গ্রা. এবং সমতুল্য লেভামিসল হাইড্রোক্লোরাইড বি.পি.।

**প্রস্তুতকারক**  
**SK+F**  
এসকেএফ ফার্মাসিউটিক্যালস্ লিমিটেড  
এলিমেন লেল্লি ডিভিশন  
কল্পগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ, বাংলাদেশ  
TM ট্রেডমার্ক

**প্রধান চিকিৎসার ব্যবহারের জন্য**  
