

DESCRIPTION

Lindamax® is a preparation of Clindamycin Phosphate USP as a topical lotion form. Clindamycin Phosphate is a water-soluble ester of the semi-synthetic antibiotic. Clindamycin inhibits bacterial protein synthesis by binding to the 50s subunit of the ribosome. It has activity against Gram-positive aerobes and anaerobes as well as the Gram-negative anaerobes. Clindamycin is bacteriostatic.

INDICATIONS

Lindamax® topical lotion is indicated in the treatment of acne vulgaris. It can also be used in the topical treatment of erythrasma, rosacea, periorificial dermatitis, folliculitis, stasis, chronic lymphoedema, familial pemphigus & dermal ulcer.

CONTRAINDICATIONS

Lindamax® lotion is contraindicated in individuals with a history of hypersensitivity to preparations containing clindamycin or lincomycin, a history of regional enteritis or ulcerative colitis, or a history of antibiotic-associated colitis.

PRECAUTIONS

Lindamax® lotion can cause burning and irritation of the eye. In the event of accidental contact with sensitive surfaces (eye, abraded skin, mucous membranes), wash with copious amounts of tap water.

SIDE-EFFECTS

Burning, itching, dryness, erythema, oiliness/oily skin, peeling.

USE IN PREGNANCY & LACTATION

Pregnancy category B

No adequate and well-controlled studies in pregnant women. Because animal reproduction studies are not always predictive of human response, this drug should be used during pregnancy only if clearly needed. Because of the potential for serious adverse reactions in nursing infants, a decision should be made whether to discontinue nursing or to discontinue the drug, taking into account the importance of the drug to the mother.

PHARMACEUTICAL PRECAUTION

Store below 25 °C, keep away from light & wet place. Keep out of reach of children.

PACKAGING

Bottle containing 25 mL of lotion. Each mL lotion contains Clindamycin Phosphate USP equivalent to Clindamycin 10 mg.

HOW TO USE

Before using the lotion, wash the face properly.



Then shake the bottle properly.

Open the cap of bottle and pour the lotion on the spatula.




Apply the lotion smoothly with spatula to make a thin film of lotion in the entire affected area.

Do not touch the affected area with bare finger.



Do not wash the face within 3 hours after using lotion.

The lotion can be used two times daily.



SK-F

Manufactured by
ESKAYEF BANGLADESH LIMITED
DHAKA, BANGLADESH
© REGD. TRADEMARK
M/PM00805 V03

বর্ণনা

লিন্ডাম্যাক্স® লোশন হচ্ছে ক্লিন্ডামাইসিন ফসফেট ইউ.এস.পি. এর ১% ভর/ভি/ভি টপিক্যাল ত্রিপরেশন। এটি রাইবোসোম 50s এর সাথে যুক্ত হয়ে ব্যাকটেরিয়ার প্রোটিন সংশ্লেষণকে বন্ধ করে। এটি গ্রাম পজেটিভ এরোবিক ও অ্যানেরোবিক ব্যাকটেরিয়ার প্রতি অত্যন্ত সক্রিয়। ক্লিন্ডামাইসিন একটি ব্যাকটেরিয়ারোধী এ্যান্টিবায়োটিক।

নির্দেশনা

লিন্ডাম্যাক্স® টপিক্যাল লোশন ত্রণের চিকিৎসায় নির্দেশিত। এটি ইরাইড্রোসিস, রোজাসিয়া, পেরিওরিসিয়াল ডার্মাইটিস, ফলিকুলাইটিস, স্ট্যাসিস, দীর্ঘমেয়াদী লিফেডেমা, ফেমিলিয়াল পের্ফিগাস এবং ডার্মাল আলসার এর চিকিৎসায় ব্যবহার্য।

প্রতিদ্রবণ

ক্লিন্ডামাইসিন অথবা লিনকোমাইসিন এর প্রতি সংবেদনশীলতা অথবা আলসারেটিভ কোলাইটিস এর ক্ষেত্রে **লিন্ডাম্যাক্স®** লোশন ব্যবহার করা যাবে না।

সতর্কতা

লিন্ডাম্যাক্স® লোশন চোখের জ্বালা বা প্রদাহ করতে পারে। তাই দুর্ঘটনাবশতঃ কোন সংবেদনশীল অঙ্গ (চোখ, ত্বক বা মিউকাস মেমব্রেন) এর স্পর্শে আসলে প্রচুর পরিমাণ পানি দিয়ে ধুয়ে ফেলতে হবে।

পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া

প্রদাহ, চুলকানি, ইরাইডেমা, তৈলাক্তত্ব, পিলিং হতে পারে।

গর্ভবস্থায় এবং অন্যান্যদানকারী মায়েরদের ক্ষেত্রে

গর্ভবতী মহিলাদের উপর কোন পর্যাপ্ত ও সুনিয়ন্ত্রিত গবেষণা থেকে সঠিক ধারণা পাওয়া যায়নি। গর্ভবস্থায় এই ওষুধ ব্যবহারের ক্ষেত্রে সতর্ক হতে হবে।

নার্সিং শিশুর প্রতিক্রিয়ার সম্ভাবনা: এই ওষুধের গুরুত্ব মায়ের উপর অনুধাবন করে ওষুধটি ব্যবহার করা যাবে কিনা তা ঠিক করতে হবে কারণ নার্সিং শিশুর ক্ষেত্রে গুরুতর বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

ফার্মাসিউটিক্যাল সতর্কতা

আলো ও অর্দ্রতা থেকে দূরে এবং ২৫ °সে এর নীচে রাখুন। শিশুদের নাগালের বাইরে রাখুন।

প্যাকেজিং

প্রতিটি বোতলে রয়েছে ২৫ মি.লি. লোশন। প্রতি মি.লি. লোশন এ রয়েছে ক্লিন্ডামাইসিন ১০ মি. গ্রা. এর সমতুল্য ক্লিন্ডামাইসিন ফসফেট ইউ.এস.পি.।

ব্যবহারবিধি

ব্যবহারের পূর্বে মুখ ভালভাবে ধুয়ে নিন।



বোতলটি ভালমত ঝাঁকিয়ে নিন।

বোতলের কাপটি খুলুন এবং স্প্যাচুলাতে অল্প করে ঢালুন।



স্প্যাচুলাটি দিয়ে আক্রান্ত স্থানে কোমলভাবে লোশন এর হালকা প্রলেপ লাগান।

আক্রান্ত স্থান আঙ্গুল দিয়ে স্পর্শ করবেন না।



লোশন লাগানোর তিন ঘণ্টার মধ্যে মুখ ধোঁত করবেন না।

এই লোশনটি দিনে দুই বার ব্যবহার করা যাবে।



প্রস্তুতকারক
এসকেএফ বাংলাদেশ লিমিটেড
ঢাকা, বাংলাদেশ
© রেজিস্টার্ড ট্রেডমার্ক