

W - 80 mm

## Facid BT<sup>®</sup> Cream

Fusidic Acid BP &amp; Betamethasone Valerate BP

### DESCRIPTION

Facid BT<sup>®</sup> cream is a combined preparation of Fusidic Acid & Betamethasone Valerate. The active substances, Fusidic Acid and Betamethasone Valerate are suspended as micronized materials in the formulation. Fusidic acid is a member of the fucidane group of naturally occurring antibiotics that exerts its action by blocking the protein synthesis of bacteria. Betamethasone, as a topical corticosteroid, has anti-inflammatory, anti-pruritic, and vasoconstrictive actions but the exact mechanisms of these actions are unknown.

### INDICATIONS

Facid BT<sup>®</sup> cream is indicated for the treatment of eczematous dermatoses including atopic eczema, discoid eczema, stasis eczema and seborrheic eczema when secondary bacterial infection is confirmed or suspected.

### DOSAGE AND ADMINISTRATION

#### Adults and children aged 6 years and over:

A small quantity should be applied to the affected area twice daily until a satisfactory response is obtained. A single treatment course should not normally exceed 2 weeks.

### CONTRAINDICATIONS

Known hypersensitivity to the drug substances. Acne rosacea and perioral dermatitis. Skin lesions of viral, fungal or bacterial origin.

### SIDE-EFFECTS

Prolonged and intensive treatment with potent corticosteroids may cause local atrophic changes in the skin, including striae, thinning and dilation of superficial blood vessels, particularly when applied to the flexures or when occlusion is employed. As with other topical corticosteroids sufficient systemic absorption to produce hypercorticism can occur with prolonged or extensive use. Children are at particular risk. Hypersensitivity reactions to Fusidic Acid are rare. However, if signs of hypersensitivity occur, treatment should be withdrawn.

### PRECAUTIONS

Long-term continuous therapy should be avoided, particularly in the face, on flexures, and intertriginous areas, and in infants and children.

### USE IN PREGNANCY

Topical steroids should not be used extensively in pregnancy. Fetal development abnormalities have been seen in animals due to systemic absorption.

### PHARMACEUTICAL PRECAUTION

Do not store above 25 °C. Keep away from light and wet place. Keep out of reach of children.

### PACKAGING

#### Facid BT<sup>®</sup> Cream:

Tube containing 10 g cream. Each gram cream contains Fusidic Acid BP 20 mg & Betamethasone Valerate BP equivalent to Betamethasone 1 mg.

**SK+F**

Manufactured by

**ESKAYEF PHARMACEUTICALS LTD.**

RUPGANJ, NARAYANGANJ, BANGLADESH

© REGD. TRADEMARK

R/PM2611 V01

## ফ্যাসিড বিটি<sup>®</sup> ক্রীম

ফুসিডিক এসিড বি.পি. এবং বিটামিথাসন ভ্যালারেট বি.পি.

### বর্ণনা

ফ্যাসিড বিটি<sup>®</sup> ক্রীম ফুসিডিক এসিড এবং বিটামিথাসন ভ্যালারেট এর যৌথ প্রস্তুতি। সক্রিয় উপাদান হিসেবে ফরমুলেশনটিতে ফুসিডিক এসিড এবং বিটামিথাসন ভ্যালারেট, মাইক্রোনাইজড উপাদান হিসেবে সাস্পেন্ডেড অবস্থায় রয়েছে। ফুসিডিক এসিড প্রাকৃতিকভাবে গঠিত অ্যান্টিবায়োটিকের ফুসিডেন গোষ্ঠীর সদস্য, যা ব্যাকটেরিয়ার প্রোটিন সংশ্লেষণ বন্ধ করে তার কাজ করে। বিটামিথাসনের টপিকাল কর্টিকোস্টেরয়েড হিসেবে, প্রদাহবিরোধী, চুলকানি-বিরোধী এবং রক্তনালীর সংকোচনকারী কার্যকলাপ রয়েছে, তবে এই কার্যকলাপের সঠিক প্রক্রিয়া অজানা।

### নির্দেশনা

ফ্যাসিড বিটি<sup>®</sup> ক্রীম একজিমাটাস ডার্মাটোসিসের চিকিৎসার জন্য নির্দেশিত, যার মধ্যে এটিপিক একজিমা, ডিসকয়েড একজিমা, স্ট্যাসিস একজিমা এবং সেবোরিক একজিমা অন্তর্ভুক্ত রয়েছে, যখন সেকেন্ডারি ব্যাকটেরিয়াল সংক্রমণ নিশ্চিত বা সন্দেহ করা হয়।

### সেবনমাত্রা ও প্রয়োগবিধি

প্রাপ্তবয়স্ক এবং ৬ বছর বা তার উপরে শিশুদের জন্য:

আক্রান্ত স্থানে প্রতিদিন দুইবার অল্প পরিমাণ ক্রীম প্রয়োগ করা উচিত, যতক্ষণ না পর্যন্ত সমস্তোষজন্মক প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়। সাধারণত একটি একক চিকিৎসা কোর্স ২ সপ্তাহের বেশি হওয়া উচিত নয়।

### প্রতিনির্দেশনা

ঔষধের উপাদানের প্রতি সংবেদনশীলতা, অ্যাকনি রোসাসিয়া এবং পেরিওরাল ডার্মাটাইটিস। ভাইরাল, ছত্রাকজনিত বা ব্যাকটেরিয়াল কারণে ত্বকের ক্ষত।

### পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া

দীর্ঘমেয়াদী এবং তীব্র কর্টিকোস্টেরয়েড ব্যবহার ত্বকে স্থানীয় অ্যাট্রফিক পরিবর্তন ঘটাতে পারে, যেমন স্ট্রাই, পাতলা হয়ে যাওয়া এবং ত্বকের উপরিভাগের রক্তনালীর প্রসারণ, বিশেষত ভাঁজযুক্ত স্থানে প্রয়োগ করা হলে বা বন্ধ পরিবেশে ব্যবহার করা হলে। অন্যান্য স্থানীয় কর্টিকোস্টেরয়েডের মতোই, পর্যাপ্ত সিস্টেমিক শোষণের ফলে দীর্ঘমেয়াদী বা ব্যাপক ব্যবহারে হাইপারকর্টিসিজম দেখা দিতে পারে। শিশুদের জন্য এটি বিশেষত বেশি ঝুঁকিপূর্ণ। ফুসিডিক এসিডে সংবেদনশীলতার প্রতিক্রিয়া বিরল। তবে, যদি সংবেদনশীলতার লক্ষণ দেখা যায়, তবে চিকিৎসা বন্ধ করা উচিত।

### সতর্কতা

দীর্ঘ সময় ধরে, বিশেষত মুখে, ভাঁজযুক্ত এবং সংযুক্ত স্থানে, এবং নবজাতকদের ও শিশুদের ক্ষেত্রে নিরবচ্ছিন্ন খেরাপি এড়ানো উচিত।

### গর্ভাবস্থায় ব্যবহার

গর্ভাবস্থায় টপিকাল স্টেরয়েড ব্যাপকভাবে ব্যবহার করা উচিত নয়। প্রাণীতে সিস্টেমিক শোষণের কারণে ক্রমের বিকাশে অস্বাভাবিকতা দেখা গেছে।

### ফার্মাসিউটিক্যাল সতর্কতা

আলো এবং অর্ধ্রতা থেকে দূরে, ২৫ °সে. তাপমাত্রায় বা এর নিচে রাখুন। শিশুদের নাগালের বাইরে রাখুন।

### প্যাকেজিং

#### ফ্যাসিড বিটি<sup>®</sup> ক্রীম:

প্রতি টিউবে রয়েছে ১০ গ্রাম ক্রীম। প্রতি গ্রাম ক্রীমে রয়েছে ফুসিডিক এসিড বি.পি. ২০ মি.গ্রা. এবং বিটামিথাসন ১ মি.গ্রা. এর সমতুল্য বিটামিথাসন ভ্যালারেট বি.পি.।

**SK+F**

প্রস্তুতকারক



এসকেএফ ফার্মাসিউটিক্যালস্ লিমিটেড

রূপগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ, বাংলাদেশ

© রেজিস্টার্ড ট্রেডমার্ক

## PM SPECIFICATION

Creative ID: CSD\_04

Job Name: Facid BT Insert	Size: W - 80 mm, L - 190 mm		Paper: 55 gsm offset paper		
No. of Color: 2 (Extra)	Lamination: N/A		Loading Process: N/A		Others: N/A
Process Color Print: N/A	Pantone Color Code	 Black C	 2347 C		

	Creative Service Department	Marketing Department	PD/QC/Contract Customer	Approved By
Comments				
Signature & Date				