

160 mm

80 mm

PinarofTM Cream

Tapinarof INN 1% W/W

DESCRIPTION

PinarofTM is a steroid-free preparation of Tapinarof INN. It is a noble, first-in-class, small-molecule aryl hydrocarbon receptor (AhR) agonist that is indicated for the treatment of plaque psoriasis in adult.

INDICATIONS

PinarofTM is indicated for the topical treatment of plaque psoriasis in patients above 18 years of age.

DOSAGE AND ADMINISTRATION

- Apply a thin layer of **PinarofTM** cream to affected areas once daily.
- Wash hands after application, unless **PinarofTM** cream is for treatment of the hands.

CONTRAINDICATIONS

Hypersensitivity to active component

SIDE EFFECTS

Common side effects are folliculitis, nasopharyngitis, contact dermatitis, pruritis, headache and flu.

PRECAUTION AND WARNING

- External use only. Tapinarof cream is not for oral, ophthalmic, or intravaginal use.
- If there is any hypersensitivity issue with the use of Tapinarof, treatment should be discontinued.

USE IN SPECIFIC POPULATION

- Pregnancy:** Available data in pregnant women are insufficient to evaluate for a drug-associated risk of major birth defects, miscarriage, or other adverse maternal or fetal outcomes.
- Lactation:** No data are available regarding the presence of Tapinarof in human milk or the effects of Tapinarof on the breastfed infant, or on milk production.
- Children:** Safety and efficacy of Tapinarof have not been established in patients with psoriasis under 18 years of age.

DRUG INTERACTION

None

STORAGE

Store below 30 °C temperature, keep away from light and wet place. Keep out of reach of children.

PACKAGING

PinarofTM Cream:

Each pack has a tube containing 30 g cream. Each gram cream contains Tapinarof INN 10 mg.

SK+F

Manufactured by
ESKAYEF PHARMACEUTICALS LTD.
TONGI, GAZIPUR, BANGLADESH
TM TRADEMARK
PM10421 V01

80 mm

পিনারফTM ক্রীম

টাপিনারফ আই.এন.এন. ১% ড্রিউ/ড্রিউ

বর্ণনা

পিনারফTM টাপিনারফ আই.এন.এন. এর স্টেরয়েড-মুক্ত একটি প্রস্তুতি। এটি একটি নোবেল অ্যারাইল হাইড্রোকার্বন রিসেপ্টর (এএইচআর) অ্যাপোনিষ্ট যা প্রাপ্তবয়স্কদের প্লাক পোরিয়াসিসের চিকিৎসায় নির্দেশিত।

নির্দেশনা

১৮ বছরের বেশি বয়সী রোগীদের ত্বকের প্লাক পোরিয়াসিস চিকিৎসার জন্য নির্দেশিত।

মাত্রা ও সেবনবিধি

- প্রতিদিন একবার করে আক্রান্ত স্থানে পিনারফTM ক্রীমের একটি পাতলা স্তর লাগান।
- যদি পিনারফTM ক্রীম হাতের চিকিৎসার জন্য না হয়, তাহলে ব্যবহারের পর হাত ধুয়ে ফেলুন।

প্রতিনির্দেশনা

সক্রিয় উপাদানের প্রতি অতিসংবেদনশীলতা।

পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া

সাধারণ পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া হল ফলিকুলাইটিস, নাসোফ্যারিঞ্জাইটিস, কন্ট্যাক্ট ডার্মাটাইটিস, প্রুরাইটিস, মাথাব্যথা এবং ফ্লু।

সাবধানতা

- গর্ভমাত্র বাহ্যিক ব্যবহারের জন্য। টাপিনারফ ক্রীম মুখে, চোখে বা যোনিপথে ব্যবহারের জন্য নয়।
- টাপিনারফ ব্যবহারে কোনো অতিসংবেদনশীলতা দেখা দেয়, তাহলে চিকিৎসা বন্ধ করতে হবে।

গর্ভাবস্থায় ও স্তন্যদানকালে ব্যবহার

- গর্ভাবস্থা:** গর্ভবতী মহিলাদের জন্য যথেষ্ট তথ্য পাওয়া যায়নি যা থেকে গুরুত্বপূর্ণ জন্মগত ত্রুটি, গর্ভপাত, অথবা গর্ভবতী মহিলা বা স্তনের অন্যান্য ঝুঁকি মূল্যায়ন করা সম্ভব।
- স্তন্যদান:** মানুষের দুধে টাপিনারফের উপস্থিতি বা বুকের দুধ খাওয়ানো শিশুর উপর বা দুধ উৎপাদনের উপর টাপিনারফের প্রভাব সম্পর্কে কোনও তথ্য পাওয়া যায়নি।
- শিশু:** ১৮ বছরের কম বয়সী সোরিয়াসিস রোগীদের মধ্যে টাপিনারফ এর নিরাপত্তা ও কার্যকারিতা প্রতিষ্ঠিত হয়নি।

অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ প্রতিক্রিয়া

নেই।

সংরক্ষণ

আলো ও আর্দ্রতা থেকে দূরে, ৩০ °সে. তাপমাত্রার নিচে সংরক্ষণ করুন। শিশুদের নাগালের বাইরে রাখুন।

সরবরাহ

পিনারফTM ক্রীম:

প্রতিটি প্যাকে একটি টিউব রয়েছে যাতে ৩০ গ্রাম ক্রীম আছে। প্রতি গ্রাম ক্রীমে ১০ মি.গ্রা. টাপিনারফ আই.এন.এন. রয়েছে।

SK+F

প্রস্তুতকারক
এসকেএফ ফার্মাসিউটিক্যালস্ লি.
টঙ্গী, গাজীপুর, বাংলাদেশ
TM ট্রেডমার্ক

PM SPECIFICATION

Creative ID: CSD_04

Job Name: Pinarof Leaflet		Size: W - 80 mm, L - 160 mm		Paper: 55 GSM Offset Paper			
No. of Color: 2 Colors	Lamination: N/A		Loading Process: N/A			Others: N/A	
Process Color Print: N/A	Pantone Color Code	2597 C	2347 C				

	Creative Service Department	Marketing Department	PD/QC/Contract Customer	Approved By
Comments				
Signature & Date				